



ACTIVE FILLERS

CG *Styler*600

PROSTROLANE
B-Series

INYECTABLES
INNOVADORES

*Péptidos novedosos
con tecnología de
liberación sostenida*



www.cirumed.cl • ventas@cirumed.cl

Único **relleno revitalizante** para arrugas dinámicas con **efecto relajante**

Beneficios de CG Styler 600:

- *Corrige tanto arrugas superficiales como profundas.*
- *Revitaliza y mejora textura de la piel.*
- *Resultado de aspecto natural.*
- *Puede colocarse en frente, región temporal y nasolabial.*



PRESENTACIÓN DE CADA CAJA:

1 jeringa x 1ml por paquete


Composición del producto:

10mg/ml (HA) PBS (solución salina tamponada con fosfato, Hialuronato de sodio (1.0%)
Complejo de péptidos (Sh-Pentapeptide-12 SP, Octapeptide-11).

Aplicación recomendada: 1ml por área.

INYECTABLES INNOVADORES

*Péptidos novedosos con tecnología de liberación sostenida.
Para rostro, ojos y contorno corporal. Contiene ácido hialurónico
no reticulado y su formulación favorece la bioestimulación celular.*



LIPOLÍTICO



**CONTOURNO
DE OJOS**




**NUTRICIÓN PROFUNDA
DEL ROSTRO**



**ILUMINADOR Y
DESPIGMENTANTE**

Dermal filler **Prostrolane Inner-B**



INDICACIÓN

Prostrolane Inner-B está indicado para el tratamiento del daño de tejido subcutáneo causado por efectos químicos, físicos y traumáticos (como flacidez de irregularidades en la dermis superficial y la piel celulítica).









COMPOSICIÓN

PBS (Phosphate Buffered Saline), Sodium Hyaluronate (0.7%), Peptide complex (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11)

CONTENIDO

2 mL jeringa prellenada (sin aguja)

ZONAS DE APLICACIÓN PROSTROLANE INNER-B




CLINICAL TEST DATA

Dermal filler Prostrolane Inner-B

01. Double chin 2 syringes per session (3sessions by 2weeks of interval)


Before

After



Before


After



02. Abdomen 4 syringes per session (4sessions by 2weeks of interval)


Before

After



Before

After



03. Love Handles 2 syringes per session (4sessions by 2weeks of interval)

Before

After



03. Love Handles 2 syringes per session (4sessions by 2weeks of interval)

Before

After



04. Thighs 4 syringes per session (4sessions by 2weeks of interval)

Before


After



05. Knees 2 syringes per session (4sessions by 2weeks of interval)

Before

After



06. Upper Arms 2 syringes per session (3 sessions)

Before


After




07. Jowl 1 syringes per session (3sessions by 2 weeks of interval)

Before

After



Dermal filler **Prostrolane Inner-B^{SE}**



INDICACIÓN

Prostrolane Inner-Bse está indicado para el tratamiento del daño de tejido subcutáneo causado por efectos químicos, físicos y traumáticos (como flacidez de irregularidades en la dermis superficial y la piel celulítica).

COMPOSICIÓN

PBS (Phosphate Buffered Saline), Sodium Hyaluronate (0.7%), Peptide complex (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11)

CONTENIDO

1 mL jeringa prellenada (sin aguja)



Dermal filler Prostrolane Natural-B



INDICACIÓN

Prostrolane Natural-B está indicado como implante dérmico medio o profundo para el tratamiento de tejido subcutáneo dañado por efectos químicos, físicos y traumáticos (arrugas faciales y pliegues).

COMPOSICIÓN

PBS(Phosphate Buffered Saline), Sodium Hyaluronate (0.7%)


Peptide Complex (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-92)

CONTENIDO

2 mL jeringa prellenada (sin aguja)

APLICACIÓN DE PROSTROLANE NATURAL-B

- **Uso recomendado:**
2 mL por área
- **Frecuencia:**
1 sesión cada dos semanas
(total dos sesiones)



CLINICAL TEST DATA

Dermal filler Prostrolane Natural-B

01. Nasolabial folds & under-eyes 2 syringes per session (3sessions by 2weeks of interval)




02. Forehead 2 syringes per session (3sessions by 2weeks of interval)



03. Neck 2 syringes per session (3sessions by 2weeks of interval)



Dermal filler **Prostrolane Blanc-B**



INDICACIÓN

Prostrolane Blanc-B está indicado como implante dérmico para el tratamiento del daño de tejido subcutáneo causado por efectos químicos, físicos y traumáticos (como lesiones causadas por la exposición solar).

COMPOSICIÓN

PBS(Phosphate Buffered Saline), Sodium Hyaluronate (0.7%), Peptide Complex (Oligopeptide-92, Octapeptide-11, Feruloyl Oligopeptide-33, Valprooyl Oligopeptide-33)

CONTENIDO

2 mL jeringa prellenada (sin aguja)

APLICACIÓN DE PROSTROLANE BLANC-B

- **Uso recomendado:**
2 mL por área
- **Frecuencia:**
1 sesión cada dos semanas
(total dos sesiones)

CLINICAL TEST DATA

Dermal filler Prostrolane Blanc-B

Skin tone & Brightness 2 syringes per session (2 sessions by 2 weeks of interval)





CG *Styler* 600

PROSTROLANE

B-Series